



Oficiul fitosanitar Dolj
Bvd. N. Romanescu nr. 39D
Craiova, 200738
T +40(251) 448191
ofdolj@anf.ro

256
192

COMUNA MUNICIPIULUI CRAIOVA

C.I.C-12

63.896

20 Luna 02 Anul 2023

NR. 392/20.02.2023

BULETIN DE AVERTIZARE NR.5

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **Paduchele din San-Jose (larve hibernante), Paduchele testos al piersicului, Paduchele testos al prunului, Paianjenul rosu al pomilor (oua de iarna), Aacarianul rosu comun (oua de iarna), Acarieni (oua de iarna), Afide (oua de iarna), Eriofide.**

(o scurta descriere a organismului daunator si modul de atac, fotografii mod de atac)

Se recomanda efectuarea tratamentului II de iarna in pomicultura, viticultura, arbori ornamentali si arbusti fructiferi (pana la umflarea mugurilor) cu:

1. OVIPRON TOP-2500 ml/100 l apa sau
 - 1500 ml/100 l apa
 - 2500 ml/100 l apa-vita de vie (acarioza, paduchele lanos, paduchele testos, paianjenul rosu comun)

2. MOSPILAN 20 SG+TOIL-0,450kg/ha+0,5% sau

3. JUVINAL 10 EC-0,1%

Alte produse de protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

Perioada optima de tratament: Tratamentele pot fi aplicate preventiv in perioada de repaus vegetativ in momentul cand temperaturile pe perioada de repaus vegetativ in momentul cand temperaturile pe perioada noptilor **nu scade sub 0 grade Celsius**. Tineti cont de temperaturile inregistrate in momentul aplicarii tratamentelor si temperaturile inregistrate pe parcursul noptilor. Ziua, temperatura optima de aplicare este de 10-12 grade Celsius si noaptea temperaturile **sa nu coboare sub 0 grade Celsius**

Pentru prevenire si combatere se recomanda aplicarea tratamentului dupa executarea lucrarilor de igiena culturala si agrotehnice.

Suprimarea tuturor ramurilor cu simptome de boli (rapan, fainare, focul bacterian, fructe moniliate, etc.)

Eliminarea si arderea pomilor uscati neproductivi, ai celor afectati de focul bacterian, cancerul de scoarta, a culburilor de insecte defoliatoare.

In cazul soiurilor sensibile la fainare (soiul Jonathan), unde anul trecut s-a manifestat acest agent patogen, taierea lastarilor cu 5-6 cm mai jos de la locul atacului.

Taieri de formare a scheletului (coroanei) in plantatiile tinere, regenerare la cele in declin, suprimarea inaltimii la 50-60 cm a puietilor plantati in toamna.

Se distruge toti drajonii porniti din radacina, tufe de maracini, buruienile (toate sunt gazde preferate pentru boli si daunatori).

Lucrarile solului intre randuri sau in jurul pomilor, cu ingroparea frunzelor cat mai adanc. Tratamentul se aplica in zilele insorite cu temperaturi mai mari de 4 °C si fara vant. Este important sa se efectueze o imbaiere totala a pomilor, de la varf pana la colet.

Verificati, cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjuratori

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si comletarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991al ACA din Romania,Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentatiri 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor , precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor).

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale,al ministrului mediului,apelorsi padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor cu PPP si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP, Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor postat pe site-ul: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR - Autoritatea Nationala Fitosanitara. Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei PPP pe care le utilizeaza, pe o perioada de cel putin 3 ani, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----

Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----

Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnatura	Data inceperii recoltarii produsului agricol	Nr. si data documentului prin care s-a data in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/ -daunatori/ buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza Omologata/ doza folosita	Suprafata	Cantitati utilizate (kg, l)			

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau a administratorului societatii



Responsabil Prognoza si Avertizare,
Draganeanu, Elisabeta

BULETIN DE AVERTIZARE NR.6

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **Soarecele de camp (Microtus a.)**
(o scurta descriere a organismului daunator si modul de atac, fotografiile mod de atac)



Soarelele de camp-Microtus a. este activ tot timpul anului, chiar si sub stratul de zapada. Soarelele de camp se hraneste cu frunzele unor culturi in prima perioada de vegetatie, putand compromite culturile de cereale de toamna dupa rasarire, in timpul iernarii sau primavara; in acelasi mod pot fi distruse lucernierele si puietii de pomi si arbusti fructiferi.

Se recomanda efectuarea tratamentelor la culturile agricole de toamna si perene(lucera,trifoi),plantatii pomicole, pepiniere, pajisti naturale si culturi agricole de toamna(cereale paioase,rapita) recomandam efectuarea de tratamente chimice pentru combaterea soarecilor pe parcelele unde densitatea daunatorului este de 4-5 colonii/ha cu:
1. ARVALIN -5 bucat /gaierie

Alte produse de protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriu Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

Alte recomandari: Se recomanda ca tratamentele sa se execute toamna tarziu si in general, cand vegetatia este mai putin dezvoltata.

Pentru combatere se recomanda si masuri profilactice:

-araturi adanci la 30 cm, pentru distrugerea cuiburilor de rozatoare, efectuate imediat dupa recoltatul culturilor.

-evitarea prelungirii recoltatului pentru a impiedica familiile de rozatoare sa stranga hrana si sa se inmulteasca.

-efectuarea mecanica de santuri cu pluguri pe perimetrul parcelelor.

Se vor instala placute cu mentiunea „**TEREN TRATAT**”.

Verificati, cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentarii 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor).

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara. Conform HG.1230/2012 art.3 alineatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----
 Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----
 Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul- de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omolo gată/ doza folosită	Supra- față ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura fermierului sau a administratorului societății (și ștampila, după caz).

Coordonator
Danciu Iuliana



[Handwritten signature]

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Draganeanu Elisabeta

[Handwritten signature]